

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: юлия

Возраст: 48

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2009 19:07:38

формирования заключения врача: 21.02.2009 23:16:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/77800/answer/77801>



Заключение врача

Уважаемая юлия! Интерстициальный цистит – симптомокомплекс нарушений мочеиспускания, ведущий к уменьшению емкости мочевого пузыря. Причины развития такого состояния остаются невыясненными, существуют только теории. Характерными симптомами являются позывы на мочеиспускание, учащение мочеиспускания, никтурия (мочеиспускание в ночное время), боли в надлобковой области или в проекции мочевого пузыря, стихающая после мочеиспускания. Интерстициальный цистит еще называют диагнозом исключения, т. е. сначала надо исключить все другие заболевания мочевого пузыря. Если в результате обследования они исключены, тогда и устанавливается диагноз интерстициального цистита. Характерным только для этого заболевания является язва Ханнера (или Гуннера – зависит от правильности перевода с английского языка). Она обнаруживается при цистоскопии, делается биопсия. Но у Вас вряд ли имеется интерстициальный цистит, т. к. нет снижения емкости мочевого пузыря. Обратитесь к грамотному урологу. Удачи!