

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Аля

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 24.02.2005 12:40:50

**формирования заключения врача:** 26.02.2005 18:05:12

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8052/answer/8053>



## Заключение врача

Уважаемая Аля! Меатостеноз – чаще всего врожденное состояние, которое характеризуется сужением дистального отдела уретры. При этом заболевании необходимо не только проводить лечение самого сужения, но и обязательно обследовать верхние мочевыводящие пути (мочевой пузырь, почки). Бужирование – начальный этап лечения стриктуры, если Вы проводите эти процедуры только неделю, то еще рано судить о результате. Из оперативных методик при меатостенозе проводят меатотомию (рассечение наружного отверстия) специальным инструментом. Эта операция проводится под общим обезболиванием. После меатотомии также ежедневно проводят бужирование для предотвращения нового сужения. С уважением.