

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: светлана

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.02.2005 16:55:58

формирования заключения врача: 27.02.2005 21:32:42

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/8092/answer/8093>



Заключение врача

Уважаемая Светлана! Камень в левой почке имеет небольшие размеры и может в дальнейшем отойти самостоятельно. Если он не отойдет, то будет увеличиваться в размерах, в этом случае необходим контроль (анализы мочи и УЗИ 2 раза в год). В правой почке в результате (скорее всего, врожденной аномалии) имеется стриктура (сужение) лоханочно-мочеточникового сегмента. Поэтому в правой почке имеется нарушение оттока мочи, т. е. гидронефроз (или расширение почечной лоханки). Заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточник называется рефлюксом, необходимо выяснить его степень. Что касается обострений цистита после половых контактов, то можно предположить их связь с урогенитальной инфекцией (хламидии, трихомонады, кандиды, уреоплазмы, микоплазмы, гарднереллы). В любом случае сейчас рано говорить об оперативном вмешательстве, сначала Вашу дочь надо дообследовать, уточнить диагноз. После получения результатов всех обследований можно будет определяться с дальнейшей тактикой. С уважением.