

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 09.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/820/answer/821>



Заключение врача

Уважаемый Алексей! При длительно текущих простатитах часто возникает такое состояние, при котором снижается тонус ацинусов (выводных протоков) предстательной железы. Семенная жидкость, которая образуется, не выводится полностью из-за снижения тонуса. Возникает застой семенной жидкости. Выделение студнеобразного содержимого как раз говорит об однократном опорожнении семенных пузырьков. Также при простатитах, особенно длительно текущих, некоторые доли предстательной железы, которые принимали участие в воспалении, постепенно склерозируются, т.е. замещаются соединительной тканью. При этом имеет значение не только количественное уменьшение функциональной ткани предстательной железы, но и снижение её гормон-метаболизирующей функции – развивается снижение активного метаболита тестостерона (мужского полового гормона). Рекомендовать можно наблюдение уролога, массаж простаты (с дренирующей целью – улучшение оттока секрета простаты), физиопроцедуры. Удачи!