

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Наталия

**Возраст:** 54

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.03.2009 12:50:28

**формирования заключения врача:** 24.03.2009 11:15:19

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/82913/answer/82914>



## Заключение врача

Уважаемая Наталия! Прежде, чем подвергать себя инвазивным методам необходимо дополнительно выполнить: 1. Обследовать на ЗППП полового партнера. 2. Также нужен осмотр на кресле на предмет диспозиции уретры (слишком низкого ее расположения по отношению к влагалищу, в результате чего выделения из влагалища и области промежности во время полового акта попадают на уретру и потом в мочевой пузырь). Если это подтвердится, то Вам рекомендуют или оперативное лечение - транспозицию уретры или постоянный прием малых доз уросептиков после каждого полового акта. 3. Посев мочи на флору, посев мочи на микобактерии туберкулеза, моча на атипичные клетки, КУДИ - комплексное уродинамическое исследование. 4. Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833. Удачи. Удачи!