

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Игорь

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 19.03.2005 08:26:15

**формирования заключения врача:** 19.03.2005 19:58:58

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8456/answer/8457>



## Заключение врача

Уважаемый Игорь Пантелеевич! Уреаплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреоплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреоплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганный кровообращения. У мужчин уреоплазмы вызывают воспалительные заболевания предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря. Поэтому лечиться или нет – Ваше решение. В медицинских кругах (особенно за рубежом) этот вопрос является дискуссионным. Я считаю, что эту инфекцию необходимо лечить у обоих партнеров одновременно, причем во время лечения и до получения отрицательного контрольного результата (методом ПЦР-диагностики) не рекомендуется жить половой жизнью. Удачи!