

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Кирилл

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.03.2005 11:57:10

формирования заключения врача: 28.03.2005 20:58:43

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/8626/answer/8627>



Заключение врача

Уважаемый Кирилл! Уреаплазмы и микоплазмы передаются половым путем и являются возбудителями воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриоргального кровообращения. У мужчин уреаплазмы и микоплазмы вызывают воспалительные заболевания предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря. Поэтому лечиться или нет – Ваше решение. В медицинских кругах (особенно за рубежом) этот вопрос является дискуссионным. Я считаю, что эту инфекцию необходимо лечить у обоих партнеров одновременно. Удачи!