

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алена

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.03.2005 13:41:36

**формирования заключения врача:** 28.03.2005 20:59:08

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8630/answer/8631>



## Заключение врача

Уважаемая Алена! Чтобы точно выяснить причину болевого синдрома, необходимо тщательно обследоваться: общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ (почек, мочевого пузыря), экскреторную урографию (внутривенно вводится контрастный препарат, потом делается серия рентгеновских снимков). Последнее обследование необходимо как раз для диагностики нефроптоза, определение его степени и степени нарушения мочеоттока (что и является причиной болевого синдрома). Если причиной будет все-таки нефроптоз, то Вам можно рекомендовать ношение бандажа, комплекс лечебной физкультуры. Если это не поможет, то помочь может только оперативное лечение - операция нефропексия (подшивание почки). Удачи!