

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Раиля

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.03.2005 14:44:35

**формирования заключения врача:** 28.03.2005 20:59:27

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8632/answer/8633>



## Заключение врача

Уважаемая Раиля! При беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи (т. е. расширению лоханок), активизации патогенной флоры, и, соответственно, имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. На сроке 27 недель расширение лоханки справа до 11 мм - это допустимое явление. Вам необходимо обратиться к урологу и всю беременность быть под его наблюдением, сделать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, анализ мочи по Нечипоренко. Дальнейшая тактика - по результатам Вашего самочувствия и результатам анализов. Пишите, если что.