

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** наташа

**Возраст:** 53

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.04.2009 14:40:00

**формирования заключения врача:** 09.04.2009 15:02:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/86454/answer/86455>



## Заключение врача

Уважаемая Наташа! Проба Реберга -Тареева сдается следующим образом. Во время выполнения пробы нельзя принимать медикаменты, влияющие на диурез, и нужно избегать физических нагрузок; пить можно, как при обычном питьевом режиме.

Проведение пробы:

1. пробу необходимо проводить утром натощак
2. перед проведением пробы необходимо освободить мочевой пузырь: дома нужно помочиться (в унитаз) и отметить время, когда это произошло (часы и минуты)
3. сразу после мочеиспускания выпить 400-500 мл воды или слабого чая
4. через 1 час приходи в ДЦ и сдать венозную кровь на креатинин
5. еще через 1 час (т.е. через 2 часа после мочеиспускания) собрать мочу - всю порцию (можно в условиях ДЦ), и сдать ее
6. сообщить регистратору свой рост и вес.

Удачи.