

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: евгения

Возраст: 44

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.04.2009 14:59:33

формирования заключения врача: 13.04.2009 20:03:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/86783/answer/86808>



Заключение врача

Уважаемая Евгения! Удвоение почки – это часто встречающаяся аномалия развития мочевыводящих путей. Эта аномалия возникла в период внутриутробного развития, т.е. является врожденной. Часто она обнаруживается случайно, т.к. ничем себя не проявляет и никак не беспокоит. По данным большинства авторов, удвоение почки чаще сопровождается воспалительными заболеваниями (это обусловлено эмбриональной неполноценностью ткани). Основной причиной более частого заболевания почки с удвоенной лоханкой является нарушение уродинамики (нарушение движения мочи из почек по мочеточникам в мочевой пузырь). Самым частым заболеванием при удвоении почки является пиелонефрит, чаще всего в нижней половине почки. Также может встречаться гидронефроз – расширение почечных лоханок, но он развивается медленно, т.к. лоханка и чашки расширяются медленно. Сама по себе эта аномалия лечения не требует. Лечение хронического пиелонефрита при удвоении почки начинают с консервативных мероприятий. Лечение длительное, проводится курсами. Осложнения удвоения почки – гидронефроз одной из половин почки, грубая дилатация (расширение) мочеточников вследствие заброса мочи, наличие камней. Вам надо выполнить УЗИ ребенку после родов, и при наличии этой аномалии обратиться к детскому урологу, обследовать малыша для подтверждения диагноза и определения дальнейшей тактики. Удачи.