

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.04.2009 17:33:00

формирования заключения врача: 13.04.2009 10:38:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/86921/answer/86922>



Заключение врача

Уважаемый Иван! Кроме местных анестетиков и презервативов, которые являются первой линией терапии преждевременной эякуляции, существуют:

- пероральная терапия - используются специальные препараты селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Все препараты этой группы обладают целым рядом серьезных, и даже опасных, побочных эффектов, поэтому они назначаются только после осмотра пациента, некоторых обследований, отсутствии сопутствующей патологии и только на очном приеме. Сначала они назначаются в тестовом режиме, в малых дозировках, потом, если все нормально, в терапевтических дозах. Но пациент постоянно находится под наблюдением.

- хирургическое лечение - выполняется селективная резекция боковых ветвей дорзального нерва. Результаты получены хорошие, но эта операция выполняется крайне редко, т. к. количество клинических исследований еще накоплено недостаточно. Обычно этот хирургический способ не рекомендуется.

- еще одним старым и в некоторых случаях эффективным хирургическим способом лечения преждевременной эякуляции является обрезание крайней плоти - циркумцизио. В результате обрезания снижается чувствительность головки полового члена, что приводит к удлинению полового акта.

Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833.

Удачи.