

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 51

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.04.2009 11:57:00

формирования заключения врача: 16.04.2009 12:56:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/87608/answer/87609>



Заключение врача

Уважаемая Наталья! Самостоятельное мочеиспускание может восстановиться, хотя для этого потребуется много времени. В данной ситуации имеет смысл выбрать установку эпицистостомы - трубки в мочевой пузырь, которая устанавливается через переднюю брюшную стенку. Это необходимо для сохранения возможности самостоятельного мочеиспускания (что исключено при постоянном уретральном катетере). Ежедневно надо пережимать цистостому и пытаться мочиться самостоятельно, после чего открывать зажим цистостомы и дать возможность отойти моче, которая осталась в мочевом пузыре после самостоятельного мочеиспускания. Это предотвратит застой мочи в мочевом пузыре и развитие инфекции. Все вопросы невозможно решить заочно. Нужно, чтобы Ваш уролог обучил Вас (родственников) уходу за эпицистостомой, уходу за пациентами с нарушением функции тазовых органов. Можете приехать на прием ко мне (без мамы, но с мед. документами, выписками, снимками и т.д.). Мой телефон 8(926)017-52-14. Удачи.