

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.04.2009 13:02:34

формирования заключения врача: 19.04.2009 13:36:44

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/87719/answer/87721>



Заключение врача

Уважаемый Роман! 15 см - нормальная среднестатистическая длина полового члена. Методов удлинения полового члена предложено очень много. Все методы можно разделить на три группы: вакуумные, тракционные, хирургические. Первые две группы являются нехирургическими, их смысл состоит в длительном «растягивании» органа. На пропагандирование этих методов брошены большие силы рекламных компаний. Но научно до сих пор не доказана достоверная эффективность вакуумных насосов, как это утверждается в рекламе. Тракционные методы осуществляются с помощью оригинальных Экстендеров, которые также используют принцип растягивания. Если определенные части тела подвергаются воздействию постоянного и продолжительного растяжения, то клетки начинают делиться, увеличивая тем самым объем ткани. Эффективность этих методов крайне не высока, а их использование может вызвать ряд осложнений, включая потерю чувствительности головки полового члена и др. Но наиболее эффективным методом, конечно, является хирургический. Удачи.