

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олеся

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 14.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/890/answer/891>



Заключение врача

Уважаемая Олеся! Нефроптоз – опущение почек – часто встречающаяся патология у девушек с фигурой фотомодели. При этом происходит нарушение взаимной топографии органов, в результате чего нарушается отток мочи и создаются условия для активизации патогенной (болезнетворной) флоры, и, соответственно, развития вторичного пиелонефрита. Возможно, что существуют первоисточники, в которых говорится о положительном влиянии беременности на нефроптоз. К сожалению, мне не известны такие данные. Во время беременности на организм женщины возлагаются дополнительные нагрузки. Это связано с внутриутробным развитием ребенка, с усилением обменных процессов в организме матери. К моменту беременности почки должны быть в максимально здоровом состоянии, т. к. при беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи, активизации патогенной флоры, и, соответственно, к обострению пиелонефрита, повышению уровня артериальной гипертензии, что имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. Причем, во время беременности справиться с пиелонефритом гораздо труднее из-за того, что нельзя применять многие высокоэффективные препараты (риск развития патологии плода). Подытоживая все вышесказанное, Олеся, я рекомендую Вам перед наступлением беременности самым тщательным образом проверить состояние мочевыделительной системы. Если у Вас остаются вопросы после посещения Вашего уролога и нефролога, то можно рекомендовать проконсультироваться в крупном Урологическом Центре, в урологическом отделении Краевой или Областной больницы (зависит от места жительства). Если у Вас есть нарушение мочеоттока, то это все-таки урологическая проблема, поэтому я рекомендовал Вам обратиться к независимым урологам. Всего хорошего!