

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Олег

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 13.04.2005 16:17:46

**формирования заключения врача:** 15.04.2005 22:45:39

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8924/answer/8925>



## Заключение врача

Уважаемый Олег! Преждевременная эякуляция после длительного воздержания не рассматривается как патология, это вариант нормы. Прежде, чем использовать такие радикальные меры, как Zoloft, думаю, Вам необходимо использовать наиболее проверенные методы. Наиболее часто рекомендуемым способом является использование пролонгирующих (продлевающих) половой акт мазей. Это могут быть любые мази с анестетиками. Далее, известным препаратом, употребляемым при ускоренной эякуляции, является бромкамфора (по 0,2 г 2 раза в день в течение 3 недель), отрицательным моментом терапии является снижение качества эрекции (обратимое). Также можно рекомендовать старое испытанное средство - массаж простаты (количество процедур приблизительно 10-14). Далее, хлорэтиловые блокады поясничного ромба совместно с применением 10% дикаиновой (или лидокаиновой мази, или анестезиновой). Возможно, эта информация Вам поможет. Удачи!