

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Масяня

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 19.04.2005 14:40:30

**формирования заключения врача:** 19.04.2005 20:52:03

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9036/answer/9037>



## Заключение врача

Уважаемая Маша! При беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи (т. е. расширению лоханок), активизации патогенной флоры, и, соответственно, имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. У беременных встречается бессимптомная лейкоцитурия, которая требует лечения вне зависимости от симптоматики. Вам необходимо сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек. После этого можно будет определиться с лечением. Удачи!