

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Анастасия

**Возраст:** 44

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.05.2009 18:56:08

**формирования заключения врача:** 12.05.2009 11:18:26

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/91013/answer/91194>



## Заключение врача

Уважаемая Анастасия! 1. Постоянный уретральный катетер необходим для снижения степени рефлюкса - чтобы моча не забрасывалась из мочевого пузыря в почки. 2. При длительном существовании рефлюкса всегда будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может приводит к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. 3. Длительно применение антибактериальной терапии в данном случае абсолютно показано. 4. Вид оперативного вмешательства определить заочно нельзя. Все очень индивидуально. Нужно смотреть снимки, изучить всю историю заболевания. Удачи.