

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Николай

**Возраст:** 26

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.05.2009 19:15:00

**формирования заключения врача:** 18.05.2009 19:50:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/92249/answer/92250>



## Заключение врача

Уважаемый Николай!

1. Необходимо установить - какой крипторхизм (паховый, брюшной), т. е. надо установить точную локализацию неопустившегося яичка. Надо установить - или яичко не опустилось, или оно вообще отсутствует.
2. С этой целью выполняются следующие обследования: УЗИ, компьютерная томография. Если с помощью этих обследований яичко не будет найдено, то показано выполнение диагностической лапароскопии. Во время нее уточняется локализация яичка, и оно удаляется.
3. Почему удаляется? Потому, что в таком возрасте (21 год) в неопустившемся яичке уже произошли необратимые изменения, его функция будет отсутствовать. Более того, в его тканях высок риск развития злокачественных образований (рака). Поэтому яичко удаляют.
4. Если яичко при лапароскопии найдено не будет, то диагностируется монорхизм (врожденное отсутствие одного яичка).
5. Настоятельно советую решить проблему крипторхизма, не откладывать ее.

Удачи.