

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лариса Шевченко

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.04.2005 11:34:52

формирования заключения врача: 30.04.2005 21:05:10

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/9234/answer/9235>



Заключение врача

Уважаемая Лариса! Очень часто во время беременности происходит обострение хронического пиелонефрита. Этому способствуют несколько факторов. Беременность возлагает на организм женщины дополнительные нагрузки, связанные с активным развитием плода, усилением обменных процессов в организме матери. Почки - это часть организма, нагрузка на них повышается в несколько раз при беременности. Соответственно, если почки были больны до беременности, то здоровее они не станут, наоборот хронически протекающая инфекция, МКБ (мочекаменная болезнь) могут обостриться, перейти в активную фазу и потребовать срочных мер. Но тут встанет множество ограничений, обусловленных наличием плода - нельзя применять ряд высокоэффективных препаратов, так как они вредны для развивающегося ребенка, нельзя выполнить дробление камня из-за опасности повреждения беременной матки. По этой причине в беременность необходимо войти со здоровыми почками, иметь некоторый запас прочности. Наиболее подвержена изменениям при беременности правая почка (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки). Для того, чтобы удостовериться, что повышенное содержание лейкоцитов в моче - это проявление пиелонефрита, надо, прежде всего, сдать общий анализ мочи (взять катетером). Если количество лейкоцитов действительно будет повышенным, то имеет смысл провести курс противовоспалительной терапии. В любом случае Вам необходимо лечение, его объем, дополнительное обследование следует определять с Вашим урологом. Можно, конечно и не лечить, но риск того, что беременность может закончиться печально, как для ребенка, так и для Вас очень велик. Выздоровливайте!