

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виталий

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 18.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/924/answer/925>



Заключение врача

Здравствуйте ещё раз, Виталий! Приятно, что Вы снова обратились за советом. Варикоцеле – это варикозное расширение вен семенного канатика. Патология эта часто встречается у высоких худощавых мужчин в молодом возрасте. Единственным способом лечения является оперативное лечение. Способов очень много, но стандартом в лечении варикоцеле все-таки является операция по Иваниссевичу. После операции, приблизительно до 2-х месяцев, происходит запустевание вен яичка и семенного канатика. В этот период вены еще не спавшиеся, могут быть видны на УЗИ, пальпироваться, определяться в мошонке. Так как запустевают вены, в мошонке в этот период идет перестройка кровообращения, с этим связаны боли, временный дискомфорт в мошонке, заднем проходе, промежности. Также может наблюдаться временное незначительное увеличение яичка в размерах. Но это явления временные. Микрохирургическая реваскуляризация – это более инвазивный метод, более сложная технически операция, с гораздо более большим количеством осложнений. Поэтому, я, как оперирующий уролог, рекомендовал бы Вам сделать операцию по Иваниссевичу, но моя рекомендация остается лишь рекомендацией, тем более, заочной. С уважением.