

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** WertuOz

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.05.2005 20:17:42

**формирования заключения врача:** 12.05.2005 19:28:38

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9440/answer/9441>



## Заключение врача

Уважаемый WertuOz! В Вашем возрасте растяжение делать уже поздно, это рекомендуется малышам при врожденном фимозе. Более того, при насильственном открытии головки полового члена может развиться такое состояние, как парафимоз (ущемление головки вплоть до некроза). Это очень грозное осложнение фимоза, которое требует экстренного оперативного вмешательства. Операция (любая) проводится под наркозом, обычно общим, никто Вас не собирает оперировать вживую! Кроме обычного обрезания можно сделать пластику крайней плоти. Оперативных способов лечения фимоза очень много. Вы можете просмотреть их на нашем сайте в разделе «Медицинская литература», версия книги «Оперативная урология». Удачи!