

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Дмитрий

**Возраст:** 52

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.06.2009 22:45:00

**формирования заключения врача:** 05.06.2009 09:41:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/94524/answer/94525>



## Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Если в Вашем случае из-за фимоза (если он у Вас действительно есть) возникают проблемы в половой жизни, то операцию лучше сделать. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена.

Оперативное лечение может быть в виде циркумцизио (иссечение крайней плоти) или пластики крайней плоти.

Точно определить - нужна Вам операция или нет, можно только на очном приеме.

Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833. Можете приехать на консультацию ко мне, тел. 8(926)017-52-14 или 8(918)498-14-15.

Удачи.