

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 52

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.06.2009 22:45:00

формирования заключения врача: 05.06.2009 09:41:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/94524/answer/94525>



Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Если в Вашем случае из-за фимоза (если он у Вас действительно есть) возникают проблемы в половой жизни, то операцию лучше сделать. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена.

Оперативное лечение может быть в виде циркумцизио (иссечение крайней плоти) или пластики крайней плоти.

Точно определить - нужна Вам операция или нет, можно только на очном приеме.

Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833. Можете приехать на консультацию ко мне, тел. 8(926)017-52-14 или 8(918)498-14-15.

Удачи.