

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вадим

Возраст: 79

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.06.2009 10:00:00

формирования заключения врача: 07.06.2009 15:41:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/94819/answer/94820>



Заключение врача

Уважаемый Вадим! Вероятнее всего, у Вас возникла стриктура анастомоза (в зоне соединения мочевого пузыря и уретры). Это наиболее часто встречающееся осложнение после РПЭ - 1,3-22%. Для уточнения (так как это лишь предположение) необходимо выполнить УФМ (урофлоуметрию) и цистоуретрографию (микционную). Все остальные исследования (УЗИ, ОАМ, посев мочи и т.д - носят вспомогательный характер).

Если это все-таки стриктура анастомоза - то потребуются серьезное лечение - баллонная дилатация или бужирование, или рассечение холодным ножом.

Все эти рекомендации относятся к выяснению причину нарушения мочеиспускания.

Контрольные обследования (пальцевое ректальное исследование, ПСА, КТ малого таза, остеосцинтиграфия) по поводу основного заболевания ([рака простаты](#)) проводятся согласно стандартам в плановом порядке.

Удачи.