

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Денис

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.05.2005 01:06:27

формирования заключения врача: 15.05.2005 16:43:11

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/9488/answer/9489>



Заключение врача

Уважаемый Денис! Трудно проконсультировать такие состояния, которые требуют непосредственного осмотра. В Вашем случае имеют значение следующие факторы: есть ли при этом искривление полового члена, есть ли боль при эрекции, это уплотнение на поверхности полового члена появилось резко или постепенно. Дело в том, что если это возникло давно, не причиняет неудобств, боли, не прогрессирует, то и не требует активного врачебного вмешательства (это может быть вена). Если же присутствуют вышеперечисленные симптомы (искривление, боли, плотные образования), то это может быть первыми признаками такого заболевания, как болезнь Пейрони (фибропластическая индурация полового члена). Это состояние, когда на поверхности полового члена в силу неисследованных и неизвестных причин появляются фиброзные бляшки, которые постепенно уплотняются и ведут к искривлению полового члена. Эта деформация становится такой выраженной, что проведение нормального полового акта становится невозможным. Сначала проводят консервативное лечение, при его неэффективности – хирургическое. Показания к хирургическому лечению – не только безуспешное консервативное лечение, но и значительное искривление полового члена, выраженное обызвествление бляшек с четкими границами на рентгенограмме. Результаты оперативного лечения зависят от стадии болезни, от техники операции. Необходимость операции определяет врач уролог после тщательного осмотра и обследования. Вам, Денис, следует показаться урологу по месту жительства для решения всех этих вопросов. Удачи!