

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Анна

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.06.2009 08:10:31

**формирования заключения врача:** 09.06.2009 08:42:46

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/94908/answer/94918>



## Заключение врача

Уважаемая Анна! 1. С какой стороны установлен стент? 2. Со стороны установки стента не должна быть расширена почечная лоханка. Если она расширена, это говорит о том, что стент функционирует неадекватно. 3. При наличии стента в почке в общем анализе мочи могут быть и лейкоциты, и эритроциты. Пиелонефрит у Вас возник не из-за стента, а из-за нарушения оттока мочи, т. е. из-за той причины, которая потребовала установки стента. Вам ведь его установили для восстановления оттока мочи, а не на фоне полного здоровья. Необходимость назначения антибиотиков определяет Ваш лечащий врач. Если посев мочи не дал роста, то, возможно, антибиотики не нужны. Удачи.