

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.05.2005 18:51:07

формирования заключения врача: 15.05.2005 16:44:51

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/9502/answer/9503>



Заключение врача

Уважаемая Ирина! Беременность возлагает на организм женщины дополнительные нагрузки, связанные с активным развитием плода, усилением обменных процессов в организме матери. Почки - это часть организма, нагрузка на них повышается в несколько раз при беременности. Во время беременности могут возникать воспалительные процессы в дистопированной почке, нарушения мочеттока (гидронефроз - или расширение лоханки этой почки. Соответственно, если почки были больны до беременности, то здоровее они не станут, наоборот хронически протекающая инфекция, МКБ (мочекаменная болезнь) могут обостриться, перейти в активную фазу и потребовать срочных мер. Но тут встанет множество ограничений, обусловленных наличием плода - нельзя применять ряд высокоэффективных препаратов, так как они вредны для развивающегося ребенка, нельзя выполнить дробление камня из-за опасности повреждения беременной матки. По этой причине в беременность необходимо войти со здоровыми почками, иметь некоторый запас прочности. Наиболее подвержена изменениям при беременности правая почка (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки).). Но, вполне возможно, что у Вас беременность будет протекать совершенно спокойно. Когда забеременеете и будете становиться на учет, скажите об этом диагнозе своему гинекологу. Всю беременность Вы должны будете находиться на учете не только у гинеколога, но и у уролога. Пишите, если будут еще вопросы.