

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.05.2005 13:59:01

формирования заключения врача: 15.05.2005 22:12:01

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/9518/answer/9519>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Варикоцеле – варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 15-18 возраст. Варикоцеле – результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Симптоматически может не проявляться (т. е. не вызывать болей, дискомфорта и т. д.), чаще всего обнаруживается на медосмотрах. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии, т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Я рекомендовал бы Вам сделать операцию как можно быстрее. Если Вы обратитесь к урологу по месту жительства, то по системе обязательного медицинского страхования Вы можете прооперироваться в обычной муниципальной больнице совершенно бесплатно. Операция не относится к категории сложных, выполняется в любом урологическом отделении. Пишите, если будут еще вопросы.