

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 50

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.06.2009 14:51:00

формирования заключения врача: 10.06.2009 17:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/95378/answer/95379>



Заключение врача

Уважаемая Ирина! ПМР - это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может приводит к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая, иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая, и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. В настоящее время существуют эндоскопические методы лечения ПМР. Оперативных методик очень много, решать какой надо применить именно в Вашем случае, должен только лечащий врач уролог. Выбор методики зависит от оперирующего уролога по результатам обследований - степени рефлюкса, и от того, каким методом лучше владеет хирург, какой метод применяют в данной клинике. Удачи.