

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вадим, 68 лет

Возраст: 84

Пол: Мужской

Врач:

ФИО:

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.06.2009 17:40:45

формирования заключения врача: 17.06.2009 21:35:36

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/95780/answer/95788>



Заключение врача

Уважаемый, Вадим. В случае распространенного рака простаты хирургическая андрогенная блокада - кастрация (билатеральная орхэктомия) может иметь место. Однако при ПСА 9,37 нг/мл, Глиссоне 4 очень велика вероятность локализованного (опухоль в пределах капсулы предстательной железы) рака простаты. В таком случае будет возможным выполнение одного из радикальных вмешательств при раке простаты. Чтобы точно стадировать рак простаты (оценить распространенность процесса) необходимо выполнить МРТ - Магнитно-Резонансную Томографию и остеосцинтиграфию. На основании этих данных можно будет решить вопрос о более современном и избавляющем от рака простаты лечении. У Вас есть возможность обратиться к нам на очную консультацию для определения дальнейшей тактики лечения.