

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Вадим, 68 лет

**Возраст:** 83

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:**

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.06.2009 17:40:45

**формирования заключения врача:** 17.06.2009 21:35:36

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/95780/answer/95788>



## Заключение врача

Уважаемый, Вадим. В случае распространенного рака простаты хирургическая андрогенная блокада - кастрация (билатеральная орхэктомия) может иметь место. Однако при ПСА 9,37 нг/мл, Глиссоне 4 очень велика вероятность локализованного (опухоль в пределах капсулы предстательной железы) рака простаты. В таком случае будет возможным выполнение одного из радикальных вмешательств при раке простаты. Чтобы точно стадировать рак простаты (оценить распространенность процесса) необходимо выполнить МРТ - Магнитно-Резонансную Томографию и остеосцинтиграфию. На основании этих данных можно будет решить вопрос о более современном и избавляющем от рака простаты лечении. У Вас есть возможность обратиться к нам на очную консультацию для определения дальнейшей тактики лечения.