

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юлия

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.05.2005 17:41:19

**формирования заключения врача:** 19.05.2005 21:30:55

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9584/answer/9585>



## Заключение врача

Уважаемая Юлия! Всё, я растаял! Спасибо за приятные минуты, пишите каждый день и хвалите (шучу). По Вашему вопросу: носите бандаж с утра, во время наиболее значительной физической нагрузки, не затягивайте его слишком сильно. Если возникнет боль, можно принять баралгин или но-шпу. Далее, проконсультируйтесь у гинеколога и невролога (возможно, имеется сочетание патологии). Насчет непереносимости йодистых препаратов – самым лучшим препаратов на сегодняшний день считается ОМНИПАК. По крайней мере, мы его вводили людям, непереносившим другие контрастные препараты, и все было нормально. Единственным его недостатком является его дороговизна. Оптимальным вариантом является выполнение кожной пробы – это надо делать в аллергологическом центре (или на приеме у аллерголога). Если подтвердится диагноз нефроптоза, т. е. подтвердится, что боли в поясничной области вызваны нефроптозом, то имеет смысл сделать нефропексию (подшивание почки). Это можно сделать как обычном способом (открытая операция), так и лапароскопически. Если будут вопросы – пишите, с удовольствием отвечу.