

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** -

**Возраст:** 0

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.06.2009 09:25:00

**формирования заключения врача:** 22.06.2009 09:42:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/97388/answer/97389>



## Заключение врача

Уважаемая Олеся!

1. Наличие повышенного количества лейкоцитов в моче - признак воспаления мочевыводящих путей. Причиной вполне может быть клебсиелла. Лечение должно обязательно включать антибиотики. Никакой канефрон без антибиотиков не поможет.

2. Если анализы мочи нестабильные и эпизоды инфекции мочевыводящих путей постоянно повторяются, то ребенка надо дообследовать более тщательно - найти причину такого состояния. В первую очередь, надо исключить врожденные аномалии мочеполовых путей. Для этого надо сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря), экскреторную урографию с микционной цистоуретрографией.

3. На основании этих обследований лечение должно быть скорректировано.

Удачи.