

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Иван

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 31.05.2005 14:49:15

**формирования заключения врача:** 31.05.2005 18:00:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9782/answer/9783>



## Заключение врача

Уважаемый Иван! Конечно, этого чувства быть не должно. Чаще всего, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря возникает при инфравезикальной обструкции (т. е. препятствии, расположенным под мочевым пузырем). У мужчин причиной нарушения мочеиспускания, является, это, как правило, предстательная железа (при ее воспалении, застойных явлениях и т. д.). Для уточнения диагноза Вам необходимо: общий анализ мочи, УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы), анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, кандиды, микоплазмы, уреаплазмы, гарнереллы), сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Это минимальный уровень обследования, который может быть расширен Вашим лечащим врачом. Пишите, если будут еще вопросы.