

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марина

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 24.11.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 24.11.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/978/answer/979>



## Заключение врача

Уважаемая Марина! Гипоплазия почки – это уменьшение размеров почки с частичным сохранением ее функции. С подобным состоянием благополучно живут и здравствуют много мне знакомых пациентов. У некоторых людей бывает даже врожденное отсутствие одной почки (аплазия, агенезия), что также им не мешает жить и работать. Естественно, среди них имеются и больные люди. В 27 недель беременности очень сложно достоверно оценить как размеры самих почек, так и их дальнейшее развитие. Впереди ещё 13 недель беременности. За этот срок внутренние органы младенца будут ещё развиваться. Неоплазия – это злокачественное перерождение почки. Я не знаю достоверно доказанной связи между гипоплазией и неоплазией. Если у ребенка нет генетических заболеваний, что можно установить в генетической консультации, и беременность желанна, я думаю, что ее стоит сохранить. Единственное, что я могу Вам посоветовать, это наблюдать ребенка у уролога. Удачи Вам!