

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** никита

**Возраст:** 21

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.07.2009 12:20:24

**формирования заключения врача:** 04.07.2009 22:04:42

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/98135/answer/98144>



## Заключение врача

Уважаемый Никита! Фимоз может иметь место в любом возрасте. Фимоз - сужение крайней плоти, в результате чего невозможно обнажить головку полового члена. проверьте сами - если головка не открывается при сдвигании крайней плоти кзади, и ребенок испытывает боль или дискомфорт при этом, то, вероятно, фимоз есть. По данным разных авторов насчет сроков разрешения фимоза (т. е. самопроизвольного открытия головки полового члена) приводятся весьма противоречивые данные - от года до периода полового созревания. Виртуально эту проблему решить трудно, необходим непосредственный осмотр, все решается индивидуально. Если крайняя плоть узкая и длинная («хоботок»), то вряд ли такой фимоз разрешится сам, т. е. потребуются хирургическое вмешательство. Если проблема заключается в наличии синехий (тонких сращений между головкой полового члена и крайней плотью), то он может разрешиться консервативно. В таком случае необходимо делать теплые ванночки с марганцовкой слабо-розового цвета, несколько оттягивая крайнюю плоть (не насильно! не форсируя!), т. е. помогать открыванию головки. Все вопросы можно разрешить только на очной консультации. Обратитесь к детскому урологу по месту жительства, если будут вопросы - пишите. Удачи.