

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Alex

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.06.2005 01:30:10

**формирования заключения врача:** 05.06.2005 22:04:46

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9848/answer/9849>



## Заключение врача

Уважаемый Alex! Вам и Вашей девушке необходимо (на мой взгляд) принять следующую тактику. Обследоваться на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, кандиды, уреаплазмы, микоплазмы, гарнереллы), но в другой лаборатории (если есть такая возможность). Если будет обнаружена инфекция, то основное лечение должно включать антибиотики! Инстилляции, микроклизмы - это вспомогательное лечение. Следующий момент - лечение при обнаружении инфекции должно проводиться Вам обоим одновременно, даже если инфекция будет обнаружена только у одного из Вас (девушке лечение должен назначить гинеколог), причем во время лечения и до получения отрицательного контрольного результата не рекомендуется жить половой жизнью. Удачи!