

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: -

Возраст: 0

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.07.2009 21:24:00

формирования заключения врача: 04.07.2009 23:06:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/98614/answer/98615>



Заключение врача

Уважаемая Алиса!

1. Судя по описываемой картине, похоже на стрессовое недержание мочи. Но, оно, как правило, чаще возникает после родов, гинекологических операций и т.д. Чтобы уточнить характер недержания мочи у Вас, необходимо выполнить КУДИ - комплексное уродинамическое исследование, осмотреть Вас на гинекологическом кресле.

2. Если подтвердится стрессовый характер недержания мочи, то дриптан и не поможет. В такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения малоэффективны. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др.

3. Можете обратиться на очный прием к специалистам урологам (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833.

Удачи.