

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.06.2005 10:57:20

формирования заключения врача: 08.06.2005 19:37:44

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/9888/answer/9889>



Заключение врача

Уважаемая Елена! На долю стволовой формы гипоспадии приходится 10-15% всех случаев. Оптимальным возрастом для операции считается промежуток между 6 и 15 месяцами, когда легче проводить мероприятия в послеоперационный период, легче определяются технические аспекты операции. Не существует какого-либо одного лучшего метода оперативного лечения гипоспадии. Описано более 150 видов операций. Суть их всех заключается в удлинении мочеиспускательного канала. Ниилучшим методом оперативного лечения будет являться тот метод, которым лучше всего владеет оперирующий уролог. Подобного рода операции необходимо выполнять в специализированных центрах, где концентрируются больные с такой патологией, где достаточно выработана тактика ведения больных с гипоспадией, накоплено достаточно опыта. Я могу рекомендовать Вам обратиться в город Ростов-на-Дону в Ростовский Государственный Медицинский университет на кафедру урологии, зав. кафедрой урологии профессор Коган Михаил Иосифович (пер. Нахичеванский 29, РостГМУ, e-mail (Коган Михаил Иосифович): dept_kogan@mail.ru, e-mail (Белоусов Игорь Иванович): belrost_dept@mail.ru). Эта кафедра и её клиники отличаются передовыми технологиями в лечении различной сложности урологической патологии, в том числе детской. Возможно, Вам будет предложено приехать на консультацию. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. Удачи Вам!