

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: -

Возраст: 0

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.07.2009 09:36:40

формирования заключения врача: 09.07.2009 11:26:48

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/98951/answer/98952>



Заключение врача

Уважаемый Анатоий! В подобном случае аденому предстательной железы оперировать можно и нужно, т. к. именно аденома и наличие хронической инфекции и является причиной вышеназванных расстройств. Из методов удаления аденомы предстательной железы я бы рекомендовала Вам трансуретральную резекцию аденомы - т. е. через мочеиспускательный канал, без разреза передней брюшной стенки. Эта операция более щадящая, легче переносится больными (кстати, контингент больных именно такого же возраста от 60 до 85 лет), длится 30-40 минут. Наркоз при этой операции - спинномозговая (или перидуральная) анестезия, такое обезболивание применяется именно у ослабленных пожилых пациентов, которые с трудом переносят общую анестезию. Перед операцией Вашего отца обязательно осмотрит анестезиолог, который решит - какой вид анестезии наиболее применим в данном случае. Удачи!