



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

Городская клиническая больница им. Д. Д. Плетнёва

Департамента здравоохранения города Москвы

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР

Рентгенологическое отделение

Онкологический стационар
ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнёва ДЗМ»
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес: 3-я Парковая улица, дом 51, стр.1. Тел.: 8 (499) 163-23-26 (ординаторская).

Ф. И. О: Мансуров В.Р. Возраст: 54 года. Отделение: КДО.

Дата исследования: 14 ноября 2018 года. № протокола: 3809637596.

Магнитно-резонансная томография органов малого таза (простата)

с в/в болюсным контрастированием Magnevist - 20 мл.

На серии МР томограмм взвешенных по T2, T1, DWI b₄ 1400, динамическим e-THRIVE, импульсных последовательностях, в корональной, сагиттальной и аксиальной проекциях, толщиной среза в 3мм: В малом тазу свободного и отграниченного скопления жидкости нет. Мочевой пузырь наполнен достаточно, форма, размеры и положение обычные, стенки до 4мм толщиной, однородные, контур их четкий, ровный. Устья мочеточников и нижняя 1/3 без особенностей. Перивезикальная клетчатка не изменена.

Предстательная железа 36x42x46мм (~28см³), имеет форму перевернутого конуса. Зональная анатомия сохранена. Периферическая зона больше выражена сзади и латерально, чем спереди, содержит диффузные гипер- и гипоинтенсивные участки линейной и клиновидной формы на T2ВИ. На этом фоне, на уровне средней части железы, в заднелатеральной периферической зоне левой доли, визуализируется объемное образование, неправильной овальной формы, с неровными, нечеткими контурами, гипоинтенсивное на T2ВИ, гиперинтенсивное при диффузии с низким сигналом на карте ИКД, активно накапливающее контраст в раннюю артериальную фазу, с экстензией фиброзной капсулы, размерами ~ 4x8x4мм.

Центральная, переходная и периуретральная зона с простатической частью уретры представлены слабовыраженными, инкапсулированными узлами стромальной гиперплазии. Фиброзная капсула прослеживается на всем протяжении, толщиной 1мм, на уровне вышеописанного образования, деформирована. Сосудисто-нервные пучки с обеих сторон без особенностей. Семенные пузырьки симметричные по 17мм, обычной формы и положения, содержимое однородное. Фасция Денонвилле четкая, ровная. Прямая кишка и параректальная клетчатка без особенностей. Мезоректальная фасция не изменена. Увеличенных и деформированных лимфоузлов в области исследования нет. Костные структуры исследованной области без признаков вторичного изменения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина вероятного наличия объемного образования периферической зоны левой доли предстательной железы с экстракапсулярной экстензией (PI-RADSTTM v2 – категория 4) на фоне незначительной стромальной гиперплазии. Признаков регионарного метастазирования и лимфаденопатии нет.

Рекомендовано : Биопсия.

Врач рентгенолог

Костырев С.В.

